

1. 由腹外斜肌腱膜单独形成的结构是
 - A. 腹直肌鞘
 - B. 腹股沟镰
 - C. 弓状线
 - D. 腹股沟韧带
 - E. 腹白线
2. 十二指肠大乳头位于
 - A. 十二指肠上部
 - B. 十二指肠降部
 - C. 十二指肠水平部
 - D. 十二指肠升部
 - E. 十二指肠空肠曲
3. 大脑视觉中枢的主要供血动脉是
 - A. 脊髓前动脉
 - B. 脊髓后动脉
 - C. 大脑前动脉
 - D. 大脑后动脉
 - E. 大脑中动脉
4. 贴附于肾表面的被膜称
 - A. 肾筋膜
 - B. 纤维囊
 - C. 脏腹膜
 - D. 脂肪囊
 - E. 壁腹膜
5. 衡量组织兴奋性高低的指标是
 - A. 阈电位
 - B. 阈值
 - C. 刺激强度变化率
 - D. 反应的快慢
 - E. 动作电位的幅值
6. 有关钠泵的叙述, 错误的是
 - A. 凡是细胞膜上的镶嵌蛋白质
 - B. 具有 ATP 酶的活性
 - C. 是逆浓度梯度或电位转递梯度
 - D. 当细胞外钠离子浓度增多时被激活
 - E. 当细胞外钾离子浓度增多时被激活
7. 心输出量是指
 - A. 每分钟由一侧心室所射出的血量
 - B. 每分钟由左、右心室所射出的血量
 - C. 每分钟由心房所射出的血量
 - D. 心脏每搏动一次, 由一侧心室所射出的血量
 - E. 心脏每搏动一次, 由左、右心室所射出的血量
8. 去甲肾上腺素对心血管的作用主要是
 - A. 舒张血管
 - B. 升高血压
 - C. 心率加快
 - D. 强心
 - E. 增大脉压
9. 有关胸内压的叙述, 错误的是
 - A. 一般情况下是负压
 - B. 胸内压=肺内压 - 肺回缩力
 - C. 胸内负压有利于静脉回流
 - D. 使肺维持一定的扩张程度
 - E. 产生气胸时负压增大
10. 有关促胃液素的叙述, 错误的是
 - A. 促进胃酸的分泌
 - B. 促进胃窦的运动
 - C. 刺激胰岛素的释放
 - D. 刺激消化道黏膜的生长
 - E. 促进胰液的分泌和胆固醇的合成
11. 昼夜体温变动的特点是
 - A. 昼夜间体温呈现周期性波动
 - B. 午后 4~6 时体温最低
 - C. 上午 8~10 时体温最高
 - D. 昼夜间波动的幅度超过 1°C
 - E. 体温昼夜的变化与生物节律无关
12. 有关突触传递特征的描述, 错误的是
 - A. 单向传递
 - B. 突触延搁
 - C. 总和
 - D. 不易疲劳
 - E. 发放
13. 躯体运动神经末梢释放的递质是
 - A. 乙酰胆碱
 - B. 多巴胺
 - C. 去甲肾上腺素
 - D. 氨酸
 - E. 肾上腺素
14. 关于雌激素生理作用的叙述, 错误的是
 - A. 促进女性附属性器官的生长, 激发女性副性征的出现
 - B. 使子宫内膜增生, 血管增长, 腺体分泌
 - C. 增强子宫平滑肌, 对催产素的敏感性
 - D. 使阴道上皮增生角化, 糖原合成, 维持酸性环境
 - E. 刺激乳腺导管增生
15. 与糖代谢无关的激素是
 - A. 胰岛素
 - B. 甲状腺素
 - C. 肾上腺素
 - D. 去甲肾上腺素
 - E. 醛固酮
16. 以醋酸纤维素薄膜作支持物进行血清蛋白质电泳的缓冲液常用 pH 值为
 - A. 3.5
 - B. 5.5
 - C. 6.5
 - D. 7.5
 - E. 8.6
17. 酶活性测定的反应体系的叙述正确的是
 - A. 底物浓度与酶促反应速度呈直线函数关系
 - B. 温育时间必须在 120 分钟以上
 - C. 反应体系中不应该用缓冲溶液
 - D. 在 0~40°C 范围内, 反应速度随温度升高而加快
 - E. pH 值为中性
18. 有机磷酸酯农药抑制的酶是
 - A. 琥珀酸脱氢酶
 - B. 己糖激酶
 - C. 胆碱酯酶
 - D. 柠檬酸合成酶
 - E. 异柠檬酸脱氢酶
19. 磷酸戊糖途径的主要生理意义是
 - A. 生成 ATP
 - B. 防止酸中毒
 - C. 维持血糖浓度
 - D. 抑制脂肪合成

- E. 生成 NADPH
20. 引起血氨浓度升高的最主要原因是
- 肠道吸收氨增加
 - 蛋白质摄入过多
 - 肝功能严重受损
 - 肾功能衰竭
 - 脑组织供能不足
21. 蛋白质合成的直接模板是
- DNA
 - mRNA
 - tRNA
 - rRNA
 - hn-RNA
22. 蛋白质生物合成的起始复合物中不包含
- mRNA
 - DNA
 - 核蛋白体小亚基
 - 核蛋白体大亚基
 - 蛋氨酰-tRNA
23. 体内生物转化中最常见的结合反应是非营养物质与
- 硫酸结合
 - 葡萄糖醛酸结合
 - 乙酰基结合
 - 甲基结合
 - 谷胱甘肽结合
24. 一般手术切口在第七天左右拆线的原因主要是
- 肉芽组织已形成
 - 胶原纤维已产生
 - 表皮已再生
 - 炎症已消退
 - 伤口已愈合
25. 炎症的基本病理变化是
- 组织、细胞的变性坏死
 - 组织的炎性充血和水肿
 - 红、肿、热、痛、功能障碍
 - 病变组织变质、渗出、增生
 - 周围血液中白细胞增多和炎区白细胞浸润
26. 纤维组织来源的恶性肿瘤，按命名原则应称为
- 恶性纤维瘤
 - 纤维瘤
 - 纤维母细胞瘤
 - 纤维瘤恶变
 - 纤维肉瘤
27. 风湿性心内膜炎常累及的心瓣膜是
- 三尖瓣
 - 二尖瓣
 - 肺动脉瓣
 - 主动脉瓣
 - 三尖瓣和肺动脉瓣
28. 高血压病并发脑出血的常见部位是
- 大脑皮质
 - 桥脑
 - 小脑
 - 内囊及基底节区
 - 延髓
29. 冠状动脉粥样硬化最常累及的动脉分支是
- 右冠状动脉主干
 - 左冠状动脉主干
 - 左冠状动脉旋支
 - 右冠状动脉旋支
 - 左冠状动脉前降支
30. 十二指肠溃疡的典型症状是
- 进食后呕吐
 - 疼痛与进食脂肪有关
 - 进食后疼痛可缓解
 - 左上腹钝痛
 - 右上腹痉挛性疼痛
31. 急性重症型病毒性肝炎的病理变化特点是
- 广泛变性及点状坏死
 - 嗜酸性变和形成嗜酸性小体
 - 碎片状坏死
 - 桥接坏死
 - 广泛坏死
32. 肝硬化的特征性病理变化是
- 肝细胞变性坏死
 - 汇管区炎细胞浸润
 - 纤维组织增生
 - 假小叶形成
 - 肝细胞再生
33. 成人肺结核病最常见的类型是
- 局灶型
 - 浸润型
 - 慢性纤维空洞型
 - 干酪样肺炎
 - 结核性胸膜炎
34. 不属于继发性肺结核临床病理特征的是
- 病变多从肺尖开始
 - 主要沿支气管播散
 - 病程较长，渗出、增生、坏死病变并存
 - 肺门淋巴结显著肿大
 - 多见于成人
35. 结核病的基本病变属于
- 急性增生性炎
 - 纤维索性炎
 - 化脓性炎
 - 变质性炎
 - 特殊性炎
36. 临床上抢救中度有机磷酸酯类中毒的药物是
- 碘解磷定
 - 阿托品和毛果芸香碱
 - 阿托品和新斯的明
 - 阿托品和碘解磷定
 - 碘解磷定和新斯的明
37. 阿托品对下列有机磷酸酯类中毒症状无效的是
- 瞳孔缩小
 - 流涎流汗
 - 腹痛腹泻
 - 小便失禁
 - 骨骼肌震颤
38. 对快眼睡眠时相影响小，成瘾性较轻的催眠药是
- 哌替啶
 - 地西洋
 - 氯丙嗪
 - 甲丙氨酯
 - 苯巴比妥
39. 限制哌替啶应用的主要不良反应是

- A. 眩晕
B. 成瘾性
C. 抑制呼吸
D. 恶心、呕吐
E. 体位性低血压
40. 治疗类风湿关节炎疼痛选用
A. 吗啡
B. 哌替啶
C. 山莨菪碱
D. 阿司匹林
E. 对乙酰氨基酚
41. 有解热镇痛作用而抗炎作用很弱的药物为
A. 阿司匹林
B. 对乙酰氨基酚
C. 氢化可的松
D. 哌替啶
E. 氯丙嗪
42. 心绞痛急性发作时，为迅速缓解症状，应首选
A. 皮下注射阿托品
B. 肌内注射哌替啶
C. 口服对乙酰氨基酚
D. 舌下含化硝酸甘油
E. 口服硝酸甘油
43. 氨茶碱治疗心源性哮喘主要机制是
A. 降低血压
B. 强心利尿
C. 扩张支气管
D. 扩张外周血管
E. 兴奋中枢
44. 雷尼替丁为
A. H₂受体阻断药
B. H₁受体阻断药
C. 质子泵抑制药
D. 抗酸药
E. M受体阻断药
45. 用维生素K无效的出血原因是
A. 大剂量阿司匹林
B. 长期使用四环素
C. 华法林过量
D. 肝素过量
E. 早产儿、新生儿
46. 下列可引起听神经损害的药物是
A. 环丙沙星
B. 头孢唑林
C. 甲硝唑
D. 阿米卡星
E. 红霉素
47. 链霉素急性中毒出现口唇、面部及四肢麻木感，严重时出现呼吸抑制，解救的药物是
A. 去甲肾上腺素
B. 尼可刹米
C. 维生素B₁₂
D. 氢化可的松
E. 葡萄糖酸钙
48. 急性肺水肿咳痰的性状是
A. 脓性
B. 铁锈色
C. 棕红色
D. 粉红色泡沫样
E. 巧克力样
49. 外源性支气管哮喘，浆细胞产生使人体致敏的抗体是
A. IgA
B. IgG
C. IgE
D. IgM
E. ISD
50. 支气管哮喘发作时，最有诊断意义的体征是
A. 胸廓饱满
B. 肋间隙增宽
C. 触诊胸部语颤减弱
D. 叩诊胸部过清音
E. 听诊两肺广泛哮鸣音
51. 支气管哮喘与心源性哮喘鉴别如有困难时禁用
A. 氨茶碱
B. 沙丁胺醇
C. 异丙嗪
D. 吗啡
E. 泼尼松
52. 肺心病肺动脉高压的形成，最重要的原因是
A. 肺小动脉闭塞
B. 肺毛细血管减少
C. 血容量增加
D. 血液黏滞度增加
E. 肺细小动脉痉挛
53. 诊断慢性肺源性心脏病的主要依据是
A. 慢性支气管-肺疾病病史
B. 发绀、呼吸困难
C. 肺动脉高压、右心室肥大
D. 两肺干湿啰音
E. 酸碱平衡失调
54. 支气管扩张症最有意义的体征是
A. 贫血
B. 杵状指
C. 固定的局限性湿啰音
D. 消瘦
E. 多变的哮鸣音
55. 作为重要社会传染源的肺结核临床类型是
A. I型
B. II型
C. III型
D. IV型
E. V型
56. 早期发现肺结核最有效的方法是
A. 痰菌检查
B. 结核菌素试验
C. 血沉测定
D. 纤维支气管镜检查
E. X线检查
57. 诊断呼吸衰竭最重要的血气分析指标是
A. 动脉血氧分压低于 60mmHg
B. 动脉血二氧化碳分压高于 50mmHg
C. pH 值低于 7.35
D. 二氧化碳结合力高于 29mmol/L
E. BE < -2.3mmol/L
58. 原发性支气管肺癌早期最常见的表现是

- A. 刺激性咳嗽
B. 顽固性胸痛
C. 声音嘶哑
D. 锁骨上淋巴结肿大
E. 霍纳(Horner)综合征
59. 对诊断冠心病最有价值的辅助检查是
A. 常规心电图
B. 动态心电图
C. 心电图运动负荷试验
D. 超声心动图
E. 心音图
60. 患者从事每天日常活动即出现心悸、气短症状，休息后即缓解。其心功能分级应为
A. 心功能 1 级
B. 心功能 2 级
C. 心功能 3 级
D. 心功能 4 级
E. 以上都不是
61. 洋地黄中毒所致的心律失常最常见的是
A. 房性期前收缩
B. 心房颤动
C. 房室传导阻滞
D. 室上性心动过速
E. 室性期前收缩
62. 能抑制血管紧张素转化酶的抗高血压药是
A. 酚妥拉明
B. 卡托普利
C. 硝酸甘油
D. 胍屈嗪
E. 硝酸异山梨酯
63. 不宜用血管扩张剂治疗的心功能不全是
A. 急性左心功能不全
B. 严重高血压性心脏病合并心功能不全
C. 严重二尖瓣狭窄合并心功能不全
D. 严重主动脉瓣关闭不全合并心功能不全
E. 急性心肌梗死合并心功能不全
64. 风湿性二尖瓣狭窄，其特征性的体征是
A. 颈静脉怒张
B. 第一心音亢进
C. 肺动脉瓣区第二心音亢进伴分裂
D. 心尖区舒张期隆隆样杂音
E. Graham-Steell 杂音
65. 风湿性二尖瓣关闭不全最具有诊断意义的体征是
A. 二尖瓣面容
B. 心尖部第一心音亢进，呈拍击样
C. 二尖瓣开放拍击音
D. 心尖部收缩期吹风样杂音
E. 肺动脉瓣区第二心音增强、分裂
66. 对鉴别 2、3 级高血压有意义的诊断是
A. 有无眼底动脉硬化
B. 有无左室肥大
C. 有无左心衰竭
D. 尿中是否有蛋白
E. 血压增高的程度
67. 鉴别肾性高血压和原发性高血压的要点是
A. 血压高低
B. 有无血尿
C. 有无肾功能损害
D. 有无左室增大
E. 尿改变和高血压发病的先后
68. 亚急性感染性心内膜炎最常见的致病菌是
A. 乙型溶血性链球菌
B. 草绿色链球菌
C. 革兰阴性杆菌
D. 白色葡萄球菌
E. 肠球菌
69. 关于典型心绞痛发作临床特点正确的是
A. 多于夜间睡眠时发作
B. 发作时间多超过 30 分钟
C. 疼痛性质为针刺样
D. 发作时心电图 ST 段抬高
E. 含服硝酸甘油后疼痛迅速缓解
70. 下列哪项最有助于区别心绞痛与心肌梗死
A. 疼痛部位
B. 疼痛性质
C. 有无发热
D. 心电图变化
E. 有无心率增快
71. 慢性活动性胃炎的治疗应特别注意采用
A. 强力抑酸剂
B. 胃黏膜保护剂
C. 抗幽门螺杆菌治疗
D. 促胃动力剂
E. 抗抑郁药物
72. 确诊慢性胃炎的主要依据是
A. 胃液分析
B. X 线钡餐检查
C. 粪便隐血试验
D. 病史和临床表现
E. 胃镜及胃黏膜活检
73. 消化性溃疡最主要的症状是
A. 嗝气反酸
B. 恶心呕吐
C. 节律性上腹痛
D. 无规律性上腹痛
E. 黑便
74. 诊断消化性溃疡并发幽门梗阻最有价值的临床表现是
A. 进餐后上腹部饱胀不适
B. 呕吐物量大
C. 呕吐物内含大量宿食
D. 呕吐物内无胆汁
E. 呕吐后症状可暂时缓解
75. 诊断消化性溃疡急性穿孔最有价值的临床表现是
A. 溃疡病史
B. 严重上腹疼痛
C. 腹胀，尿少
D. 上腹部疼痛
E. 肝浊音区消失
76. 肝硬化时下列临床表现中与内分泌失调有关的是
A. 夜盲
B. 黄疸
C. 全身恶病质
D. 蜘蛛痣
E. 出血点或出血斑
77. 对诊断门脉高压症最有价值的是

- A. 腹水
B. 脾大
C. 肝大、质硬
D. 黄疸、下肢水肿
E. 食管吞钡 X 线检查
78. 对肝性脑病患者的饮食治疗不恰当的是
A. 高热量
B. 高碳水化合物
C. 高维生素
D. 高蛋白质
E. 不能进食者可鼻饲或静滴葡萄糖
79. 对于出血坏死性胰腺炎最具诊断价值的实验室检测指标是
A. 血淀粉酶升高
B. 血清胆红素升高
C. 血糖降低
D. 血钙降低
E. 血镁降低
80. 结核性腹膜炎的腹腔积液大多是
A. 草黄色渗出液
B. 血性渗出液
C. 乳糜性渗出液
D. 草绿色漏出液
E. 淡黄色漏出液
81. 下列 X 线钡剂灌肠检查所见不符合溃疡性结肠炎的是
A. 病变轻微者可正常
B. 肠壁呈毛刺状或锯齿状
C. 结肠袋消失
D. 可见圆形或卵圆形充盈缺损
E. 可呈跳跃征
82. 临床上最常见的蛋白尿是
A. 肾小球性
B. 肾小管性
C. 溢出性
D. 分泌性
E. 组织性
83. 确诊急进性肾小球肾炎的依据是
A. B 型超声及腹部 X 线平片均提示双肾增大
B. 血清抗肾小球基膜抗体阳性
C. 血清免疫复合物阳性伴血清补体下降
D. 血清抗中性粒细胞胞浆抗体阳性
E. 50% 以上肾小球囊内有新月体形成
84. 治疗原发性肾病综合征的首选药物是
A. 环磷酰胺
B. 苯丙酸诺龙
C. 氯喹
D. 肾上腺糖皮质激素
E. 血浆白蛋白
85. 下列哪项不是慢性肾脏疾病肾功能恶化诱因
A. 感染
B. 应用肾毒性药物
C. 饮食中蛋白质不足
D. 有效循环血量减少
E. 严重高血压或血压骤降
86. 尿液检查下列哪项对慢性肾功能衰竭的诊断最有价值
A. 蛋白量
B. 红细胞计数
C. 白细胞计数
D. 尿比重固定于 1.010
E. 颗粒管型
87. 缺铁性贫血采用铁剂治疗, 观察疗效最早的指标是
A. 血红蛋白上升
B. 网织红细胞增高
C. 面色红润
D. 血清铁恢复正常
E. 红细胞平均体积增大
88. 最容易引起再生障碍性贫血的药物是
A. 氯霉素
B. 磺胺嘧啶
C. 环磷酰胺
D. 保泰松
E. 他巴唑(甲硫咪唑)
89. 贫血伴黄疸最可能的诊断是
A. 溶血性贫血
B. 急性失血性贫血
C. 缺铁性贫血
D. 再生障碍性贫血
E. 营养不良性贫血
90. 治疗慢性再生障碍性贫血的首选药物是
A. 肾上腺糖皮质激素
B. 雄激素
C. 碳酸锂
D. 硝酸士的宁
E. 抗胸腺细胞球蛋白
91. 符合过敏性紫癜的实验室检查是
A. 血小板减少
B. 出血时间延长
C. 凝血时间延长
D. 血块收缩不良
E. 毛细血管脆性试验可阳性
92. 下列不符合单纯性甲状腺肿的是
A. 抗甲状腺抗体正常
B. 甲状腺轻度或中度弥漫性肿大
C. 甲状腺肿大伴震颤或血管杂音
D. 随病情发展呈多结节性甲状腺肿
E. 甲状腺肿大引起气管压迫症状
93. 目前诊断甲状腺功能亢进症最可靠的检查方法是
A. 基础代谢率测定
B. 甲状腺摄¹³¹I 率测定
C. 甲状腺激素浓度测定
D. TSAb 测定
E. 抗甲状腺抗体测定
94. 腺垂体功能减退症最常见的病因是
A. 垂体或邻近的肿瘤
B. 颅内感染
C. 产后大出血
D. 颅脑外伤
E. 脑血管疾病
95. 反映糖尿病病情控制的指标是
A. 空腹及餐后 2 小时血糖
B. 尿糖定性
C. 血清胰岛素水平
D. 口服葡萄糖耐量试验
E. 血清胰岛素细胞抗体

96. 关于 2 型糖尿病, 正确的说法是
 A. 应有“三多一少”的症状
 B. 尿糖阳性
 C. 胰岛素水平低于正常
 D. 空腹血糖应升高
 E. 糖耐量试验有助于可疑病例的诊断
97. 对敌百虫杀虫剂中毒的患者, 洗胃忌用
 A. 生理盐水
 B. 2%~3% 碳酸氢钠溶液
 C. 1:5 000 高锰酸钾
 D. 清水
 E. 温开水
98. 一氧化碳中毒现场急救首先采取
 A. 吸氧
 B. 建立静脉通道
 C. 就地心肺复苏
 D. 清洗皮肤
 E. 撤离现场
99. 符合中枢性瘫痪的临床特征是
 A. 肌群瘫痪为主
 B. 有肌萎缩
 C. 肌张力增高
 D. 腱反射消失
 E. 无病理反射
100. 不符合面神经炎表现的是
 A. 患侧额纹消失
 B. 患侧鼻唇沟变浅
 C. 患侧不能闭眼
 D. 患侧不能鼓腮
 E. 常伴有偏瘫
101. 下列各项不符合蛛网膜下腔出血的是
 A. 剧烈头痛
 B. 颈项强直
 C. 血性脑脊液
 D. 偏瘫
 E. 呕吐
102. 脑栓塞的临床表现不正确的是
 A. 患者较年轻
 B. 多有风湿性心脏病史
 C. 起病急骤
 D. 多有脑膜刺激征
 E. 可有偏瘫失语
 (103~105 题共用备选答案)
 A. α 受体
 B. β_1 受体
 C. β_2 受体
 D. M 受体
 E. N 受体
103. 导致心率加快, 传导加速, 心肌收缩力加强的受体是
104. 引起支气管平滑肌舒张的受体是
105. 促进胃肠运动的受体是
 (106~108 题共用备选答案)
 A. 变质性炎症
 B. 浆液性炎症
 C. 增生性炎症
 D. 化脓性炎症
 E. 出血性炎症
106. 伤寒病属于
107. 病毒性肝炎属于
108. 流行性脑脊髓膜炎属于
 (109~110 题共用备选答案)
 A. 地西洋
 B. 哌替啶
 C. 氯丙嗪
 D. 普鲁卡因
 E. 对乙酰氨基酚
109. 在物理降温配合下能使体温降至正常以下的药物是
110. 治疗癫痫持续状态首选
 (111~112 题共用备选答案)
 A. 氨苄西林
 B. 青霉素
 C. 乙胺丁啉
 D. 利福平
 E. 异烟肼
111. 可以引起视神经炎的是
112. 对细菌及结核杆菌感染都有效的药物是
 (113~115 题共用备选答案)
 A. 肺部局限性哮鸣音, 对 β_2 受体激动剂疗效不佳
 B. 两肺满布哮鸣音, 对 β_2 受体激动剂疗效较好
 C. 哮鸣音与湿啰音并存, 对抗生素反应较好
 D. 两肺哮鸣音伴湿性啰音, 忌用肾上腺素类药物
 E. 两肺散在干鸣音, 伴呼吸音减弱
113. 喘息型慢性支气管炎
114. 支气管哮喘
115. 原发性支气管肺癌
 (116~118 题共用备选答案)
 A. 高血压病 1 级
 B. 高血压病 2 级
 C. 高血压病 3 级
 D. 高血压脑病
 E. 急进型高血压
116. 患者血压持续增高, 出现脑出血
117. 舒张压持续超过 95mmHg, 无心脑肾损害
118. 舒张压持续超过 95mmHg, 左心室增大, 心功能 I 级
 (119~121 题共用备选答案)
 A. 氢氧化铝凝胶
 B. 硫酸镁
 C. 西咪替丁
 D. 奥美拉唑
 E. 枸橼酸铋钾
119. 能强烈抑制胃酸分泌又能提高抗生素对幽门螺杆菌的疗效的药物是
120. 口服可以导泻的药物是
121. 不用于胃溃疡治疗的药物是
 (122~124 题共用备选答案)
 A. 白细胞管型
 B. 红细胞管型
 C. 透明管型
 D. 蜡样管型
 E. 上皮细胞管型
122. 正常人尿中偶可见到的
123. 对肾盂肾炎的诊断有意义的
124. 提示慢性肾小球肾炎晚期的
 (125~126 题共用备选答案)
 A. 寒战、高热、出血并迅速衰竭

- B. 头痛、呕吐、脑脊液可检出白血病细胞
 C. 低热、乏力、颈部淋巴结肿大，切口不愈合
 D. 低热、贫血、巨脾
 E. 贫血、发热、无痛性淋巴结进行性肿大
125. 中枢神经系统白血病的临床特点为
126. 慢性粒细胞白血病的临床特征是
 (127~128 题共用备选答案)
 A. 饮食治疗
 B. 正规胰岛素
 C. 长效胰岛素(精蛋白锌胰岛素)
 D. 口服降血糖药
 E. 口服降血糖药加小剂量胰岛素
127. 1 型糖尿病治疗选择
128. 2 型糖尿病并发急性感染时治疗选择
129. 52 岁男性患者，晚饭间突感左胸前区疼痛，伴有恶心、呕吐，并出现严重的呼吸困难，送医院途中死亡。尸检发现左心室前壁大面积坏死，最可能发生阻塞的血管是
 A. 右冠状动脉
 B. 左冠状动脉旋支
 C. 窦房结动脉
 D. 左冠状动脉前降支
 E. 后室间支
130. 在影响动脉血压的诸因素中，搏出量增多而其他因素不变时，脉压增大的主要原因是
 A. 收缩压、舒张压均降低
 B. 收缩压、舒张压均升高
 C. 收缩压升高，舒张压降低
 D. 收缩压降低，舒张压变化不大
 E. 收缩压升高，舒张压变化不大
131. 受检者端坐位，检查者用左手托住受检者屈曲的肘部，并用左前臂托住受检者的前臂，将左手拇指按在受检者肘窝部肌腱上，然后右手持叩诊锤叩击检查者的左拇指，正常反应为肘关节快速屈曲，此反射为
 A. 腓肠肌反射
 B. 肘反射
 C. 肌腱反射
 D. 肱三头肌反射
 E. 肱二头肌反射
132. 糖尿病患者，女，45 岁，尿糖(++++)，血糖 25mmol/L，使用胰岛素 60 单位后血糖降到 10mmol/L，此时应注意补充
 A. 氯化钾
 B. 氯化钠
 C. 氯化钙
 D. ATP
 E. 细胞色素 C
133. 女，28 岁，因发热 3 天，食欲下降，厌油，恶心，乏力就诊。体温 38.5℃，肝压 100/80mmHg。巩膜及皮肤黄染，右上腹压痛，肝在肋缘下 2cm，轻度触痛。不予考虑检查的项目是
 A. ALT
 B. AST
 C. 血胆红素测定
 D. 血清蛋白质测定
 E. CK
134. 一位亚急性细菌性心内膜炎患者，下床活动后出现意识逐渐模糊至昏迷，并有右侧偏瘫。其最可能的原因为
 A. 肺动脉栓塞
 B. 脑动脉栓塞
 C. 冠状动脉栓塞
 D. 右上、下肢动脉栓塞
 E. 右上、下肢静脉栓塞
135. 女，32 岁，因腰痛、发热、尿频、尿急、尿痛而求治。检查后诊断为大肠埃希菌所致的泌尿系感染，应首选
 A. 诺氟沙星
 B. 红霉素
 C. 氨苄西林
 D. 头孢氨苄
 E. 苯唑西林
136. 男，56 岁，慢性咳嗽、咳痰 20 年，冬季、早春明显。1 周前因受凉后畏寒、发热、咳嗽加重，咳黄色脓痰。双肺少量干湿性啰音。X 线检查：肺纹理增多，最可能应诊断为
 A. 肺结核
 B. 支气管肺癌
 C. 支气管扩张症
 D. 肺炎球菌肺炎
 E. 慢性支气管炎急性发作
137. 支气管哮喘患者，持续性发作约 26 小时，大汗淋漓、发绀、端坐呼吸，双肺肺气肿征，有散在哮鸣音。首选的治疗是
 A. 山莨菪碱(654-2) 静脉注射
 B. 补液+氨茶碱+ β_2 受体激动剂
 C. 沙丁胺醇气雾剂吸入+溴化异丙托品吸入
 D. 色甘酸钠吸入+糖皮质激素
 E. 补液+糖皮质激素+氨茶碱
138. 男，30 岁，受凉后高热，寒战，咳嗽，咳痰 3 天。体检：体温 38.5℃，右上肺语颤增强，呼吸音增强，有湿啰音。WBC $18 \times 10^9/L$ ，N 90%，L 10%。最可能诊断为
 A. 上呼吸道感染
 B. 急性支气管炎
 C. 大叶性肺炎
 D. 急性肺脓肿
 E. 肺结核
139. 男，60 岁，因咳嗽，活动后气短，发现胸腔积液，胸水化验为渗出液，经抗结核治疗 2 个月，胸液仍增多。为明确诊断，进一步应采取的措施是
 A. 加强抗结核治疗
 B. 胸水的酶学检查
 C. 胸水的结核杆菌培养
 D. 胸部超声波检查
 E. 胸水的病理细胞检查和胸膜活检
140. 男性，56 岁。近日来感心悸，乏力，头晕，心电图示：P-R 间期在相继的心动周期中逐渐延长，最后发生 QRS 波群脱漏。如此周而复始，最可能是
 A. 二度 II 型房室传导阻滞
 B. 二度 I 型房室传导阻滞
 C. 心房颤动
 D. 一度房室传导阻滞
 E. 三度房室传导阻滞
141. 女性，30 岁，患风心病二尖瓣狭窄合并关闭不全，心悸、气短、下肢水肿，每日口服地高辛 0.25mg、

双氢克尿塞 25mg, 1 个月后感恶心、呕吐, 心电图示: 窦性心律, 心率 68 次/分, 室性期前收缩二联律, 治疗应

- A. 改用毒毛花苷 K
- B. 停地高辛, 给氯化钾
- C. 停地高辛, 给呋塞米
- D. 增加地高辛用量
- E. 电复律

142. 心电图示: P 波规律出现, P-R 间期为 0.22 秒, 每隔 2 个 P 波后有一次 QRS 波群脱漏, 心房率 75 次/分, 心室率 50 次/分, 其诊断应为

- A. 第一度房室传导阻滞
- B. 第二度 I 型房室传导阻滞
- C. 第二度 II 型房室传导阻滞
- D. 第三度房室传导阻滞
- E. 房性心动过速伴 3:2 房室传导阻滞

143. 女性, 58 岁, 近半年来自觉胸前区阵发性疼痛, 常在休息或清晨时发作, 持续时间一般为 20 分钟或半小时, 含服硝酸甘油后缓解, 疼痛发作时, 心电图胸前导联 ST 段抬高, 运动负荷试验阴性, 其诊断为

- A. 初发型心绞痛
- B. 卧位型心绞痛
- C. 稳定型心绞痛
- D. 变异型心绞痛
- E. 恶化型心绞痛

144. 男, 28 岁。劳动时出现胸部闷痛, 多次晕倒, 数分钟后意识恢复。体检发现胸骨左缘闻及喷射性收缩期杂音, 屏气时杂音增强。初步诊断为

- A. 冠状动脉粥样硬化性心脏病
- B. 风湿性心瓣膜病
- C. 肥厚型梗阻性心肌病
- D. 先天性心脏病
- E. 病态窦房结综合征

145. 男, 40 岁。乙型肝炎病史已 10 年, 2 年前拟诊肝硬化。1 周末出现腹胀及巩膜黄染, 腹水检查为血性渗出液。对于明确诊断, 下列哪项检查最为重要

- A. 尿胆红素及尿胆原检查
- B. 肝功能检查
- C. 肝 B 超检查
- D. 血 AFP 检查
- E. 肝活检

146. 男, 60 岁。进行性消瘦、低热、食欲不振, 伴右上腹胀痛 3 个月。查体: 皮肤黏膜无黄染, 浅表淋巴

无肿大, 心肺检查无异常, 肝肋下 1.5cm, 剑突下 4cm 可及。白细胞 $4 \times 10^9/L$, B 超显示右叶有直径 5cm 的强回声团块, 可见液性暗区, 正确的诊断是

- A. 肝硬化
- B. 肝癌
- C. 肝囊肿
- D. 肝结核
- E. 肝脓肿

147. 男, 28 岁, 少尿, 水肿 1 月余, 7 岁时曾发现尿蛋白阳性。血压 180/120mmHg, 尿蛋白(-), 红细胞 5~10/HP, 白细胞 3~5/HP, BUN 30mmol/L, 血肌酐 860 $\mu\text{mol/L}$, 血红蛋白 65g/L, 初步诊断为

- A. 急性肾小球肾炎
- B. 慢性肾小球肾炎, 肾功能不全
- C. 肾病综合征
- D. 慢性肾盂肾炎, 肾功能不全
- E. 高血压病 3 级

148. 女, 32 岁, 突然寒战, 高热, 伴腰痛, 尿频, 尿急, 尿痛 3 天就诊。查体: 肾区有叩击痛, 化验: 尿蛋白(+), 镜检: 白细胞满视野, 白细胞管型 0~2 个/HP, 最可能的诊断是

- A. 急性肾小球肾炎
- B. 急性肾盂肾炎
- C. 慢性肾小球肾炎急性发作
- D. 慢性肾盂肾炎, 隐匿型
- E. 急性膀胱炎

149. 一孕妇, 26 岁, 妊娠 7 个月, 贫血、头昏、无力、纳差, Hb 45g/L, RBC $2.5 \times 10^{12}/L$, 血常规提示: 小细胞低色素性贫血。其贫血是

- A. 再生障碍性贫血
- B. 缺铁性贫血
- C. 稀释性贫血
- D. 维生素B₁₂缺乏
- E. 自身免疫性溶血性贫血

150. 女, 16 岁, 近 3 天双下肢伸侧出现紫癜, 分批出现两侧对称、颜色鲜红, 伴腹痛及关节痛, 血小板 $100 \times 10^9/L$, WBC $10 \times 10^9/L$, Hb 100g/L, 凝血时间正常, 应首先考虑

- A. 特发性血小板减少性紫癜
- B. 过敏性紫癜
- C. 急性白血病
- D. 再生障碍性贫血
- E. 血友病

1. 系统性红斑狼疮患者的典型皮肤损伤为
 - A. 环形红斑
 - B. 结节性红斑
 - C. 面部蝶形红斑
 - D. 多形性红斑
 - E. 网状青斑
2. 对系统性红斑狼疮的诊断最特异的检查项目是
 - A. 狼疮细胞
 - B. 抗核抗体
 - C. 类风湿因子
 - D. 抗双链 DNA 抗体
 - E. 抗 Sm 抗体
3. 类风湿关节炎的主要表现是
 - A. 游走性大关节肿痛
 - B. 全身关节肿痛伴发热、皮疹
 - C. 对称性小关节肿痛伴晨僵
 - D. 多关节肿痛伴四肢末梢感觉障碍
 - E. 腰骶痛伴晨僵
4. 病人将地上的草绳看成是一条大蛇, 这种表现是
 - A. 感觉过敏
 - B. 象征性思维
 - C. 关系妄想
 - D. 幻觉
 - E. 错觉
5. 患者坚持认为诊室内有毒气味, 立即退出诊室, 拒绝治疗, 该症状为
 - A. 幻嗅
 - B. 幻味
 - C. 幻听
 - D. 错觉
 - E. 感觉障碍
6. 幻觉是指
 - A. 对客观事物的错误感知
 - B. 对客观事物的胡思乱想
 - C. 一种丰富想象的思维过程
 - D. 在梦幻中的感觉
 - E. 缺乏相应的客观刺激时的感知体验
7. 精神分裂症与神经衰弱的重要区别是
 - A. 自知力是否存在
 - B. 生活懒散
 - C. 睡眠不佳
 - D. 工作学习效率下降
 - E. 急躁发怒
8. 治疗癔症最重要的方法是
 - A. 镇静
 - B. 针灸治疗
 - C. 心理治疗+药物治疗
 - D. 暗示疗法
 - E. 中医中药治疗
9. 术中判断心跳停止最可能的依据是
 - A. 大动脉搏动消失
 - B. 立即观察瞳孔变化
 - C. 数呼吸频率
 - D. 用听诊器听心音
 - E. 测血压
10. 心跳呼吸骤停病人现场急救的先决条件是
 - A. 口对口人工呼吸
 - B. 开放静脉输液通道
 - C. 通畅呼吸道
 - D. 心内注射复苏药物
 - E. 口对口人工呼吸和胸外心脏按压
11. 不是病人营养状况依据的指标为
 - A. 血清转铁蛋白
 - B. 血红蛋白
 - C. 血浆白蛋白
 - D. 血小板计数
 - E. 周围血液淋巴细胞计数
12. 输血早期非溶血性发热反应最常见原因是
 - A. 致敏物
 - B. 白细胞凝集素
 - C. 致热原
 - D. 肝炎病毒
 - E. 以上都不是
13. 最能反映休克预后的检测指标是
 - A. 静脉血氧测定
 - B. 动脉血气分析
 - C. 动脉血乳酸盐值
 - D. 二氧化碳结合力
 - E. 血细胞比容
14. 可引起感染性休克的是
 - A. 骨盆骨折
 - B. 氨苄西林过敏
 - C. 张力性气胸
 - D. 绞窄性肠梗阻
 - E. 脾破裂
15. 换药时发现伤口脓液有恶臭、发黑带血性, 估计感染菌为
 - A. 金黄色葡萄球菌
 - B. 链球菌
 - C. 大肠埃希菌
 - D. 铜绿假单胞菌
 - E. 类杆菌
16. 很少化脓的软组织感染是
 - A. 疔
 - B. 痈
 - C. 急性蜂窝织炎
 - D. 丹毒
 - E. 急性淋巴管炎
17. 甲状腺癌的临床表现不包括
 - A. 偶然发现甲状腺有一硬而不光滑肿块
 - B. 近甲状腺峡部活动度大的肿块
 - C. 甲状腺肿块短期内迅速增大
 - D. 甲状腺包块伴声嘶
 - E. 甲状腺包块伴颈淋巴结肿大
18. 颈淋巴结结核肿块特征不包括
 - A. 无红热, 有波动感
 - B. 融合成团, 不易推动
 - C. 质硬, 无痛, 可推动
 - D. 形成窦道或溃疡
 - E. 破溃后流出稀薄粪臭味脓液
19. 乳癌最多发的部位在乳房的
 - A. 外上象限

- B. 内上象限
C. 外下象限
D. 内下象限
E. 乳晕区
20. 嵌顿疝内容是小肠憩室, 称为
A. 闭孔疝
B. Richter 疝
C. Littre 疝
D. 腹股沟滑动性疝
E. 股疝
21. 儿童患腹股沟疝, 首选的术式是
A. 单纯疝囊高位结扎术
B. 佛格逊(Perguson)法
C. 麦克凡(McVay)法
D. 巴西尼(Bassini)法
E. 疝成形术
22. 有关腹股沟斜疝的临床表现, 错误的是
A. 发病约占腹外疝的 90%
B. 可进入阴囊
C. 可有浅环扩大
D. 压迫深环不能阻止疝内容物突出
E. 容易嵌顿
23. 腹股沟斜疝与直疝最有意义的鉴别点是
A. 发病年龄
B. 突出途径
C. 疝块外形
D. 疝内容物是否进入阴囊
E. 还纳疝内容物后, 压迫深环疝内容物是否再突出
24. 引起继发性腹膜炎的病因不包括
A. 急性阑尾炎
B. 溃疡穿孔
C. 胆囊穿孔
D. 肝硬化腹水感染
E. 手术污染
25. 溃疡病行胃大部切除的绝对手术适应证是
A. 单纯穿孔
B. 第一次出血
C. 瘢痕性幽门梗阻
D. 胰源性溃疡
E. 反复门诊治疗无效的溃疡
26. 属于绞窄性肠梗阻的是
A. 粘连性肠梗阻
B. 肠蛔虫堵塞
C. 腹腔肿块压迫致肠梗阻
D. 肠扭转
E. 炎症性狭窄
27. 怀疑肛管直肠肿瘤, 最简单而重要的检查是
A. 直肠指诊
B. 乙状结肠镜检查
C. 直肠镜检查
D. X 线气钡灌肠
E. B 型超声检查
28. 治疗急性胰腺炎时禁用
A. 抗胆碱药物
B. 吗啡止痛
C. 5-氟尿嘧啶
D. 钙剂
E. 抗生素
29. 出现明显皮下气肿的胸部损伤是
A. 闭合性气胸
B. 多根单处肋骨骨折
C. 开放性气胸
D. 大量血胸
E. 张力性气胸
30. 食管癌的早期临床表现不包括
A. 食管内异物感
B. 胸骨后针刺样疼痛
C. 咽下食物时哽噎感
D. 进行性吞咽困难
E. 上腹部烧灼感
31. 属不稳定骨折的类型是
A. 嵌入骨折
B. 斜形骨折
C. 裂纹骨折
D. 青枝骨折
E. 压缩骨折
32. 关节内骨折最常见的并发症是
A. 创伤性关节炎
B. 缺血性骨坏死
C. 骨化性肌炎
D. 骨生成异常
E. 骨折不愈合
33. 骨折临床愈合标准, 错误的是
A. 患肢无纵轴叩击痛
B. 局部无异常活动
C. X 线摄片骨折线消失
D. 解除外固定后不变形
E. 受伤上肢向前平举 1 公斤持续 1 分钟
34. 肌力测定的分级描述中, 错误的是
A. 1 级: 肌完全不能收缩, 为完全瘫痪
B. 2 级: 肌收缩可使关节活动, 但不能对抗重力
C. 3 级: 肌仅有抗重力, 无抗阻力的收缩
D. 4 级: 肌有抗重力和抗阻力的收缩
E. 5 级: 肌有对抗强阻力的收缩
35. 将患肢放在对侧肩部时, 肘不能贴胸, 而肘部贴胸时, 手不能放上肩部, 称为
A. 杜加征阳性
B. 托马斯征阳性
C. 川德伦伯征阳性
D. 盖氏征阳性
E. 加强试验阳性
36. 拾物试验阳性的骨关节疾病是
A. 髋关节结核
B. 膝关节结核
C. 化脓性髋关节炎
D. 化脓性膝关节炎
E. 腰椎结核
37. 膀胱刺激症状是指
A. 尿急、尿痛、血尿
B. 尿频、尿痛、排尿困难
C. 尿急、尿痛、排尿困难
D. 尿频、尿急、尿痛

- E. 尿痛、血尿、排尿困难
38. 肾肿瘤常见的 3 大症状是
- 疼痛、包块、低热
 - 血尿、疼痛、包块
 - 血尿、包块、高血压
 - 消瘦、血尿、低热
 - 血尿、疼痛、乏力
39. 上尿路结石最常见的典型症状是
- 肉眼血尿
 - 持续性腹痛
 - 腰疼痛+血尿
 - 发热、腰痛
 - 恶心、呕吐、出冷汗
40. 前列腺增生所致急性尿潴留时，最常用的方法是
- 服利尿药
 - 中药、针灸
 - 导尿
 - 耻骨上膀胱穿刺
 - 耻骨上膀胱造瘘术
41. 颅内压增高的 3 大主要表现，除头痛外，还有
- 呕吐、视神经乳头水肿
 - 抽搐、视神经萎缩
 - 呕吐、偏瘫
 - 呕吐、视力下降
 - 头晕、呕吐
42. 闭合性颅脑损伤，不包括
- 头皮裂伤
 - 颅底骨折
 - 脑震荡
 - 颅盖骨线状骨折
 - 颅骨凹陷骨折
43. 早孕的临床表现不包括
- 尿频
 - 腹部有妊娠纹
 - 海格征阳性
 - 嗜睡、乏力、食欲不振
 - 乳房增大，乳晕着色加深
44. 胎头矢状缝与母体骨盆入口右斜径一致，小囟门位于母体骨盆左前方，其胎位是
- 枕左横
 - 枕右横
 - 枕左前
 - 枕右前
 - 枕右后
45. 对角径是指
- 骨盆入口平面的前后径
 - 中骨盆平面的前后径
 - 坐骨棘间径
 - 耻骨联合下缘至骶岬上缘中点
 - 耻骨联合下缘至骶尾关节
46. 先兆流产的诊断依据不包括
- 尿妊娠试验阴性
 - 停经后少量阴道出血
 - 下腹坠痛
 - 子宫大小与停经时间相符
 - 子宫颈口未开
47. 中度妊娠高血压综合征的临床表现不包括
- 血压 160/110mmHg
 - 蛋白尿(+)
 - 水肿(+)
 - 无自觉症状
 - 有轻度头晕症状
48. 重型胎盘早期剥离的并发症不包括
- 子宫胎盘卒中
 - 凝血功能障碍
 - 子宫破裂
 - 产后出血
 - 急性肾功能衰竭
49. 羊水过多是指羊水量超过
- 800ml
 - 1000ml
 - 1500ml
 - 2000ml
 - 300ml
50. 妊娠合并心脏病，其发病率最高的是
- 先天性心脏病
 - 贫血性心脏病
 - 高血压心脏病
 - 风湿性心脏病
 - 围生期心脏病
51. 胎儿窘迫的主要诊断依据不包括
- 胎心率异常
 - 胎动异常
 - 胎粪污染羊水
 - 胎位异常
 - 胎儿酸中毒
52. 早期发现宫颈癌的简便、可靠的初筛方法是
- 宫颈刮片细胞学检查
 - 阴道镜
 - 宫颈活检
 - 碘试验
 - 宫颈锥形切除
53. 宫颈病理切片报告为“鳞状上皮化”，提示为
- 癌前病变
 - 原位癌
 - 浸润癌
 - 糜烂愈合过程
 - 宫颈糜烂的类型
54. 诊断宫颈糜烂 II 度的依据是糜烂面积
- 小于宫颈面积的 1/4
 - 小于宫颈面积的 1/3
 - 占宫颈面积的 1/2
 - 占宫颈面积的 3/5
 - 占宫颈面积的 2/3 以上
55. 白色稠厚呈凝乳块状白带主要见于
- 滴虫性阴道炎
 - 细菌性阴道病
 - 淋菌性阴道炎
 - 老年性阴道炎
 - 念珠菌性阴道炎
56. 不属于炎症的疾病是
- 股白肿

- B. 卵巢巧克力囊肿
C. 输卵管积水
D. 输卵管结核
E. 盆腔脓肿
57. 子宫颈癌最早出现的症状是
A. 尿频尿急
B. 接触性出血
C. 进行性下肢肿痛
D. 大量米汤样恶臭白带
E. 绝经后长期阴道流血
58. 鉴别侵蚀性葡萄胎与绒毛膜癌的主要依据是
A. 肺转移
B. HCG 测定
C. 病理检查有无组织坏死
D. 是否浸润至子宫深肌层
E. 病理检查有无绒毛结构
59. 诊断子宫性闭经的依据是
A. 注射黄体酮有撤退性出血
B. 注射黄体酮无撤退性出血
C. 雌-孕激素无撤退性出血
D. 雌-孕激素有撤退性出血
E. 雌激素有撤退性出血
60. 药物避孕的机制不包括
A. 抑制排卵
B. 增加宫颈黏液黏稠度
C. 使内膜增生不良
D. 抑制精子获能
E. 阻止精子与卵子结合
61. 关于口服短效避孕药的副反应, 正确的是
A. 类早孕反应是孕激素刺激胃黏膜所致
B. 服药期间出现阴道流血, 是由于撤退性出血所致
C. 经量增多
D. 白带增多是孕激素作用的结果
E. 体重增加
62. 不宜放置宫内节育器的是
A. 阴道炎治疗中
B. 月经干净后 3~7 天
C. 哺乳期已排除早孕
D. 剖宫产术后半年, 月经已复潮
E. 人工流产术后
63. 关于小儿运动发育的一般规律, 错误的是
A. 由上向下
B. 由近及远
C. 由不协调到协调
D. 由简单到复杂
E. 由精细到粗糙
64. 纠正低钾血症时, 不正确的是
A. 见尿补钾
B. 含钾液浓度不宜超过 0.3%
C. 纠正低钾一般要经过 2~3 日
D. 一般低钾血症可口服补钾
E. 严重低血钾可用含钾液缓慢静推
65. 佝偻病活动早期的主要表现是
A. 烦哭、夜惊、汗多
B. 烦哭、方颅
C. 多汗、蛙状腹
D. 夜惊、手镯
E. 夜惊、多汗、方颅
66. 维生素 D 缺乏性佝偻病活动期的主要表现为
A. 肌肉松弛
B. 语言发育迟缓
C. 骨骼系统的改变
D. 低热、盗汗
E. 突然惊厥或喉痉挛
67. 关于新生儿败血症, 错误的是
A. 临床表现常不典型
B. 可出现黄疸
C. 可伴肝脾肿大
D. 易并发脑膜炎
E. 均有高热
68. 新生儿缺氧缺血性脑病的病因是
A. 窒息
B. 低血糖
C. 低血钙
D. 低血镁
E. 维生素 B₆ 缺乏
69. 小儿腹泻的治疗原则, 错误的是
A. 调整饮食
B. 合理用药
C. 纠正脱水
D. 应用红霉素
E. 纠正电解质紊乱
70. 重度低渗脱水, 伴休克时, 扩容治疗采用的液体张力是
A. 1/5 张
B. 1/3 张
C. 1/2 张
D. 2/3 张
E. 等张
71. 上呼吸道感染的最常见病原体是
A. 呼吸道合胞病毒
B. 肺炎链球菌
C. 肺炎支原体
D. 轮状病毒
E. 金黄色葡萄球菌
72. 2 岁患儿, 发热咳嗽 3 天, 惊厥昏迷 1 天, 体温 39℃, 鼻扇, 肺部散在干湿啰音, 心律齐, 心率 130 次/分, 肝未触及, 诊断是支气管肺炎合并
A. 呼吸衰竭
B. 心力衰竭
C. 中毒性脑病
D. 中毒性肠麻痹
E. DIC
73. 治疗支原体肺炎首选的抗生素是
A. 氨苄西林
B. 妥布霉素
C. 氨苄青霉素
D. 红霉素
E. 链霉素
74. 不符合小儿原发综合症的常见临床表现的是
A. 结核菌素试验强阳性
B. 胸片示“双极影”

- C. 胸片上肺叶有空洞形成
D. 低热、盗汗
E. 食欲减退, 消瘦
75. 不属于红细胞生成不足性贫血的是
A. 营养性缺铁性贫血
B. 原发性再生障碍性贫血
C. 继发性再生障碍性贫血
D. 自身免疫性溶血性贫血
E. 营养性巨幼细胞贫血
76. 营养性巨幼细胞贫血是因为缺乏
A. 叶酸和铁
B. 叶酸和维生素B₁₂
C. 维生素D和维生素B₁₂
D. 叶酸和维生素C
E. 维生素A和维生素C
77. 急性肾炎患儿参加体育锻炼的标准是
A. 尿常规正常
B. 血沉正常
C. 血压正常
D. 尿艾迪斯计数正常
E. 抗“O”滴度正常
78. 婴儿时期腰椎穿刺的椎间隙是
A. 胸₁₂~腰₁椎间隙
B. 腰₁₋₂椎间隙
C. 腰₂₋₃椎间隙
D. 腰₃₋₄椎间隙
E. 腰₄₋₅椎间隙
79. 对病人就诊较晚的急性胰腺炎患者实验室检查最具有诊断意义的是
A. 血淀粉酶升高
B. 血清脂肪酶升高
C. 血清胆红素升高
D. 血糖降低
E. 血镁降低
80. 不符合风湿热诊断标准的主要表现是
A. 发热
B. 心脏炎
C. 游走性多发性关节炎
D. 皮下结节
E. 环形红斑
81. 新生儿散发性甲状腺功能减低症最早出现的症状是
A. 腹泻
B. 贫血
C. 生理性黄疸消退延迟
D. 心率正常
E. 发热
82. 10个月男婴, 不能独坐, 眼距宽, 眼裂小, 鼻梁低平, 皮肤细嫩, 舌伸出口外, 通贯掌, 可能的诊断是
A. 呆小病
B. 先天愚型
C. 佝偻病活动期
D. 苯丙酮尿症
E. 先天性脑发育不全
83. 《执业医师法》规定, 医师在执业活动中应履行的义务之一是
A. 在注册的职业范围内, 选择合理的医疗、预防、保健方案
B. 从事医学研究、学术交流, 参加专业学术团体
C. 参加专业培训, 接受继续医学教育
D. 努力钻研业务, 更新知识, 提高专业水平
E. 获得工资报酬和津贴, 享受国家规定的福利待遇
84. 医疗机构的医务人员违反《献血法》规定, 将不符合国家规定标准的血液用于患者的, 由县级以上卫生行政部门给予的行政处罚是
A. 警告
B. 罚款
C. 吊销《医疗机构执业许可证》
D. 责令改正
E. 限期整顿
85. 三大营养素占热能比例为
A. 糖 60%~65%, 蛋白质 10%~25%, 脂肪 12%~15%
B. 糖 40%~60%, 蛋白质 20%~30%, 脂肪 10%~20%
C. 糖 60%~65%, 蛋白质 10%~15%, 脂肪 15%~25%
D. 糖 40%~50%, 蛋白质 10%~20%, 脂肪 20%~30%
E. 糖 50%~60%, 蛋白质 20%~30%, 脂肪 10%~20%
86. 在驾驶员、接线员、银行出纳员等人群中, 高血压的患病人数增加, 此病属于
A. 工伤
B. 职业病
C. 职业特征
D. 工作有关疾病
E. 非职业性疾病
87. 职业病诊断的首要条件是
A. 有明确的职业史
B. 生产环境调查
C. 特有的临床表现
D. 特异性生化检验
E. 同工种工人患病情况
88. 切断传播过程的措施不包括
A. 早期发现病人
B. 预防接种
C. 开展健康教育
D. 杀虫
E. 隔离病人
89. 恩格利于1977年提出的现代医学模式是
A. 生物医学模式
B. 生物-社会医学模式
C. 生物-心理医学模式
D. 生物-心理-社会医学模式
E. 心理-社会医学模式
90. 马斯洛将人的需要由低级到高级划分为5个层次, 最高一层的是
A. 尊重的需要
B. 生理的需要
C. 自我实现的需要
D. 安全的需要
E. 归属与爱的需要

91. 反映标准化心理测验可靠性的技术指标是

- A. 样本量
- B. 常模
- C. 标准差
- D. 信度
- E. 效度

92. 市场经济条件下的医德建设, 重点是纠正和防止

- A. 稀有卫生资源分配不公的现象
- B. 追求个人正当利益的现象
- C. 忽视卫生事业的福利性
- D. 强调医务人员的社会价值
- E. 片面追求经济效益的行为

93. 当病人对医生所实施的诊治手段有质疑时, 医生必须详细介绍, 在病人愿意时才能继续进行, 这属于患者的

- A. 平等医疗权
- B. 疾病认知权
- C. 知情同意权
- D. 社会责任权
- E. 保护隐私权

(94~96 题共用备选答案)

- A. 影响妄想
- B. 关系妄想
- C. 钟情妄想
- D. 嫉妒妄想
- E. 被害妄想

94. 病人认为自己的思想、情感和行为均受雷达的控制, 因而终日坐卧不安, 这种表现是

95. 病人认为同事之间聊天是在议论他, 别人咳嗽是在唾骂他, 这种表现属于

96. 病人坚信配偶对自己不忠贞, 另有新欢, 因而经常跟踪监视配偶的日常活动。这种表现属于

(97~99 题共用备选答案)

- A. 金黄色葡萄球菌
- B. 溶血性链球菌
- C. 铜绿假单胞菌
- D. 大肠杆菌
- E. 类杆菌

97. 脓液恶臭带血发黑

98. 脓液黏稠、黄色

99. 脓液稀薄、量多、粉红色

(100~102 题共用备选答案)

- A. 腹股沟斜疝
- B. 腹股沟直疝
- C. 股疝
- D. 脐疝
- E. 切口疝

100. 多见于老年人的是

101. 多见于中年女性的是

102. 多见于儿童及青壮年的是

(103~105 题共用备选答案)

- A. 肱骨髁上骨折
- B. 股骨颈骨折
- C. 股骨干骨折
- D. 腓骨上段骨折
- E. 胫骨下 1/3 骨折

103. 易发生延迟愈合的是

104. 易发生神经损伤的是

105. 易发生缺血坏死的是

(106~108 题共用备选答案)

- A. 流产
- B. 异位妊娠
- C. 早产
- D. 妊娠高血压综合征
- E. 前置胎盘

106. 妊娠晚期反复无痛性阴道流血的是

107. 能引起急性腹痛的是

108. 患者可能发生抽搐的是

(109~111 题共用备选答案)

- A. 萎缩型子宫内膜
- B. 子宫内膜腺囊型增生过长
- C. 黄体功能不全
- D. 黄体萎缩不全
- E. 子宫内膜非典型增生

109. 停经 3 个月后不规则阴道流血 2 个月, 经血量时多时少, 常见为

110. 子宫内膜癌的癌前期改变是指

111. 月经周期正常, 经期延长, 经血量多, 应诊断

(112~113 题共用备选答案)

- A. 低钾血症
- B. 低钙血症
- C. 低血糖症
- D. 低氯血症
- E. 低镁血症

112. 久泻或佝偻病的患儿脱水酸中毒纠正后出现惊厥, 多考虑为

113. 久泻或营养不良患儿输液后出现精神萎靡, 腹胀, 肠鸣音减弱, 多为

(114~116 题共用备选答案)

- A. 营养性巨幼细胞贫血
- B. 营养性缺铁性贫血
- C. 溶血性贫血
- D. 再生障碍性贫血
- E. 生理性贫血

114. 末梢血象中红细胞数目降低比血红蛋白量降低更明显的是

115. 末梢血象中血红蛋白量降低比红细胞数目降低更明显的是

116. 不需要进行特殊治疗的是

(117~119 题共用备选答案)

- A. 直方图
- B. 直条图
- C. 线图
- D. 圆形图
- E. 散点图

117. 表示某地 1990~1994 年肝炎病例的年龄分布, 宜采用

118. 表示某地 1995 年 5 种不同类型病毒性肝炎发病人数占病毒性肝炎发病总人数的比重, 宜采用

119. 进行甲乙两地 1995 年 5 种不同类型病毒性肝炎发病率的比较, 宜采用

120. 女, 30 岁。低热伴关节肿痛 3 个月, 轻度贫血, 抗核抗体(+), 抗双链 DNA 抗体(+), 疑患系统性红斑狼疮, 治疗首选的药物是
- 非甾体抗炎药
 - 抗生素
 - 免疫抑制剂
 - 糖皮质激素
 - 柳氮磺胺吡啶
121. 女, 50 岁。掌指和腕关节反复肿痛 2 年余, 近 1 个月病情加重, 晨起时出现关节僵硬, 活动后可缓解。首先考虑的诊断是
- 风湿性关节炎
 - 痛风
 - 强直性脊柱炎
 - 骨关节炎
 - 类风湿关节炎
122. 女, 30 岁, 半年来总担心双手有细菌而经常反复洗手, 一天无数次总不放心, 自知不对, 又无法控制。此症状属于
- 妄想
 - 强迫行为
 - 刻板动作
 - 情绪焦虑
 - 强制性思维
123. 患者女, 20 岁, 被机械绞伤右前臂 1 小时, 右前臂屈侧皮肤见长 8cm 的裂口, 深达骨膜, 边缘不整齐, 污染严重出血不止, 且右腕不能背伸, 对其处理错误的是
- 应立即行清创术
 - 出血如非重要血管可结扎处理
 - 如有神经断裂必须一期修复
 - 肌腱如缺损严重可二期处理
 - 断裂主干血管一期吻合
124. 男, 30 岁, 体重 60kg。热力烧伤后 4 小时入院。查: 休克, I° 烧伤面积 10%, II° 烧伤面积 20%, III° 烧伤面积 30%, 入院后 8 小时内补液总量最好是
- 2000~2250ml
 - 2300~2500ml
 - 3000~3250ml
 - 3400~3500ml
 - 3600~4000ml
125. 男, 29 岁, 左下胸受压, 伴腹痛、恶心、呕吐入院。检查: 面色苍白, 四肢湿冷, 脉搏 120 次/分, 血压 80/60 mmHg, 腹腔穿刺抽出不凝血液。应采取正确的处理原则是
- 直接送手术室手术
 - 大量快速输液, 纠正休克
 - 积极抗休克, 同时迅速手术
 - 休克好转后再手术
 - 抗感染、止血
126. 男, 38 岁, 右下胸部撞伤 6 小时, 伤后感上腹部疼痛, 头晕。查 BP90/70mmHg, P110 次/分, 面色苍白, 右腹部压痛、反跳痛、肌紧张较明显。X 线透视示肝阴影扩大、右膈抬高。首先应考虑的诊断是
- 外伤性血气胸
 - 肝破裂
 - 右肾破裂
 - 结肠肝曲破裂
 - 胃十二指肠穿孔
127. 男, 36 岁, 便血 2 年, 初为排便后有少量鲜血滴出, 无痛, 便后出血自行停止, 近半年来偶有块状物自肛门脱出, 便后自行回缩, 最可能的诊断是
- 直肠癌
 - 混合痔
 - 外痔
 - 内痔
 - 直肠脱垂
128. 女, 42 岁, 上腹部胀闷不适 3 年, 伴反酸嗝气、厌油和右肩不适反复发作, 曾有一次胆绞痛史。体检巩膜无黄染, 右上腹有深压痛。B 型超声检查示胆囊缩小。其诊断最可能
- 胃、十二指肠溃疡
 - 右肾、输尿管结石
 - 急性胆囊炎
 - 慢性胆囊炎
 - 慢性阑尾炎
129. 男, 55 岁, 2 个月前出现吃干硬食物时有哽噎感, 喜软食, 且哽噎感越来越明显, 体检无阳性体征, 钡餐造影见局限性食管管壁僵硬, 化验检查无明显异常。首先应考虑的是
- 食管憩室
 - 食管炎
 - 食管静脉曲张
 - 食管癌
 - 贲门失弛缓症
130. 女, 60 岁, 不慎路滑跌倒, 右臀部着地, 扶起不能行走, 右髋部明显压痛, 经 X 线摄片诊断为右股骨颈骨折, 其右下肢畸形的位应是
- 屈曲内旋
 - 屈曲外旋
 - 屈曲内收
 - 延长内旋
 - 短缩外旋
131. 成人, 出现腰痛数月, 行走时双手扶腰, 伴有盗汗, 午后潮热、消瘦、食欲不振、全身乏力。应首先考虑的诊断是
- 腰椎间盘突出症
 - 腰肌劳损
 - 腰椎结核
 - 髋关节结核
 - 脊柱骨退行性变
132. 男, 40 岁, 因塌方右腰部被砸伤, 伤后出现大量肉眼血尿, 右肾区明显肿胀, 压痛, 皮下可见瘀血斑, 脉搏 120 次/分, BP80/50mmHg, 印象诊断是
- 肾挫伤
 - 肾实质损伤
 - 肾实质与肾盂肾盏破裂
 - 全层裂伤
 - 肾蒂断裂
133. 男 50 岁, 骑跨在树干上, 会阴部受伤, 伤后排尿困难及尿潴留, 会阴部及阴囊肿胀, 瘀斑伴剧痛, 可能性最大的诊断是

- A. 会阴部软组织损伤
 B. 尿道球部损伤
 C. 尿道膜部损伤
 D. 膀胱破裂
 E. 骨盆骨折
134. 男, 28 岁, 头部外伤, 当即昏迷约 3 小时, 醒后出现头痛、呕吐, 右耳道流血性液体, 诊断应为
 A. 脑震荡、颅前窝骨折
 B. 脑挫伤、颅中窝骨折
 C. 脑震荡、颅后窝骨折
 D. 脑挫伤、颅前窝骨折
 E. 脑震荡、颅中窝骨折
135. 女, 24 岁, 妊娠 38 周, 头晕眼花 1 天。体格检查: 血压 160/96mmHg, 产科检查: 宫底位于脐与剑突之间, 胎头固定, 枕右前位, 胎心 142 次/分, 尿蛋白(++). 本例正确的诊断应是
 A. 高血压病
 B. 急性肾炎(肾病型)
 C. 轻度妊娠高血压综合征
 D. 中度妊娠高血压综合征
 E. 先兆子痫
136. 女, 29 岁, 经产妇, 妊娠 33 周反复性阴道流血, 曾晕倒一次。体格检查: 面色苍白, 脉搏 110 次/分, 血压 90/60mmHg, 腹软无压痛, 宫底位于脐与剑突之间。枕左前位, 胎心 156 次/分, 错误的检查方法是
 A. B 型超声检查
 B. 血常规检查
 C. 肛诊检查
 D. 凝血功能检查
 E. 胎儿电子监护
137. 初产妇, 胎儿娩出 5 分钟后, 阴道多量流血达 300ml, 暗红色, 有凝血块, 首先考虑的是
 A. 宫颈裂伤
 B. 凝血功能障碍
 C. 子宫收缩乏力
 D. 胎盘部分剥离
 E. 子宫胎盘卒中
138. 初产妇, 妊娠 40 周, 滞产, 产钳助产 4000g 女婴, 胎盘娩出后阴道流血, 量时多时少, 检查子宫软, 本例应诊断为
 A. 胎膜残留
 B. 软产道损伤
 C. 胎盘残留
 D. 子宫收缩乏力
 E. 凝血功能障碍
139. 女, 48 岁, 近半年月经不规则, 现停经 60 天, 阴道流血 12 天, 量时多时少。妇科检查: 宫颈光滑, 子宫稍大, 质中等硬, 双侧附件无异常, 为明确诊断最恰当的检查方法是
 A. 尿妊娠试验
 B. 基础体温测定
 C. 宫颈刮片细胞学检查
 D. 子宫内膜病理检查
 E. 子宫输卵管碘油造影
140. 未婚女, 28 岁, 闭经 2 年, 肛诊: 子宫正常大小, 孕激素试验阴性, 下一步最佳检查方法是
 A. 垂体兴奋试验
 B. 基础体温测定
 C. 染色体检查
 D. 激素水平测定
 E. 雌激素试验
141. 女, 25 岁, 初产妇, 孕 50 天, 行人工流产术, 术中出现心率 50 次/分, BP 80/50mmHg, 面色苍白, 呕吐, 应考虑为
 A. 子宫穿孔
 B. 腹腔内出血
 C. 吸宫不全
 D. 羊水栓塞
 E. 人工流产综合征
142. 男, 4 个月。人工喂养, 未添加辅食, 两天来轻咳, 流涕, 伴低热, 今晨抽搐 4 次, 每次持续约 2 分钟, 缓解后玩耍如常, 为确诊最有价值的化验检查是
 A. 心电图
 B. 腹部 B 型超声
 C. 胸片
 D. 血钾、钠、氯、血糖测定
 E. 血钙、磷、碱性磷酸酶测定
143. 女, 10 个月, 高热 1 周伴咳嗽, 喘憋重, 嗜睡, 面色苍白, 左肺背部叩诊稍浊, 闻少量中小水泡音, 胸片示左下肺大片阴影。血白细胞 $9 \times 10^9/L$, 中性 0.56, 淋巴 0.44, 最可能的诊断为
 A. 肺炎链球菌肺炎
 B. 腺病毒肺炎
 C. 金黄色葡萄球菌肺炎
 D. 毛细支气管炎
 E. 肺炎支原体肺炎
144. 男, 体重 6kg, 体温 38℃, 呼吸 80 次/分, 脉搏 180 次/分, 面色苍白, 烦躁气促, 鼻扇及三凹征明显, 两肺可闻及中小湿性啰音, 心音低钝, 肝肋下 3.5cm, 诊断为肺炎合并心力衰竭, 强心应用的毛花苷丙首次剂量为
 A. 0.06mg
 B. 0.12mg
 C. 0.18mg
 D. 0.24mg
 E. 0.30mg
145. 1 岁半小儿, 其父患浸润性肺结核, 有咯血, 小儿与父母同住, 无任何症状, 胸片未见异常, 结核菌素试验阳性, 应采取的措施是
 A. 立即给小儿接种卡介苗
 B. 隔离小儿, 继续观察
 C. 口服异烟肼, 疗程 6 个月
 D. 口服异烟肼+链霉素肌注, 疗程 1 年
 E. 不必给小儿服药, 定期复查胸片, 发现病灶再行抗结核治疗
146. 男, 3 岁, 发育落后, 少动, 发绀, 有蹲踞现象。胸骨左缘 2~4 肋间可闻 III 级收缩期喷射性杂音, X 线示胸片心脏外形呈靴形。应诊断为
 A. 房间隔缺损
 B. 室间隔缺损
 C. 动脉导管未闭
 D. 法洛四联症

E. 肺动脉狭窄

147. 4岁男孩, 10天前受凉感冒服药后好转, 3天前眼睑水肿, 伴尿少, 今天烦躁不安, 抽搐2次, 体查体温 39°C, 呼吸 28次/分, 脉搏 110次/分, BP 150/110mmHg, 心肺正常肝未触及, 神经系统检查无异常。可能的诊断是急性肾炎合并

- A. 高血压脑病
- B. 循环充血
- C. 高热惊厥
- D. 低钙血症
- E. 肾功能衰竭

148. 2岁半小儿, 头大颈短, 面容呆板, 身高为 80cm, 前囟未闭, 乳牙 18个, 不会走路, 反应迟钝。X线摄片见腕部有 2个骨化中心, ^{131}I 吸收率为 19%。诊断为散发性呆小病, 应尽早使用

- A. 甲状腺片
- B. 碘剂
- C. 钙剂
- D. 生长激素
- E. 维生素 D

149. 《医疗事故处理办法》规定, 在诊疗护理工作中, 属于医疗事故的是

- A. 虽有诊疗护理错误, 但未造成病员死亡、残废、功能障碍
- B. 因诊疗护理过失, 直接造成病员死亡、残废、组织器官损伤导致功能障碍
- C. 由于病情和病员体质特殊而发生难以预料和防范的不良后果
- D. 发生难以避免的并发症
- E. 以病员及其家属不配合诊治为主要原因而造成不良后果

150. 某县从事母婴保健工作的医师胡某, 违反母婴保健法规定, 出具有关虚假医学证明而且情节严重。该县卫生局应依法给予胡某的处理是

- A. 通报批评
- B. 警告
- C. 取消执业资格
- D. 罚款
- E. 降职降薪